

癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	sLV5FU2
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発 結腸・直腸癌
1クールの日数	14日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	レボホリナート	I-LV	200	mg/m ²	div	2時間	d1
2	5-FU	5-FU	400	mg/m ²	div	全開	d1
3	5-FU	5-FU	2400	mg/m ²	div	46時間	d1~3
4							
5							
補足							

催吐リスク	軽度
前投薬	デカドロン注6.6mg
減量規定	好中球数（500/mm ³ 未満）、発熱性好中球減少症、血小板数（50,000/mm ³ 未満）、消化器系の有害事象（Grade3以上） 5-FU：血清ビリルビン>5.0mg/dLの場合は投与禁忌
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、口内炎、下痢、倦怠感
参考文献	医薬品インタビューフォーム（5-FU） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	5-FU：46時間投与の際はインフューザーポンプ使用

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	中心静脈（埋込型カテーテル使用） 生理食塩液250mL 1日1回（持続）	1本	持続
2	点滴中心静脈 メイン1側管1 生理食塩液50mL デカドロン注6.6mg 1日1回	1本 1本	15分
4	点滴中心静脈 メイン1側管1 5%ブドウ糖液250mL レボホリナート注 1日1回	1本 200mg/m ²	2時間
5	点滴中心静脈 メイン1側管1 生理食塩液50mL 5-FU注 1日1回	1本 400mg/m ²	全開
6	中心静脈（埋込型カテーテル使用） 5%ブドウ糖液250mL 5-FU注 1日1回（持続） 薬剤部はフェーザーの換算表を参照し調製	1本 2400mg/m ²	46時間