

## 癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	Nivolumab
対象疾患	がん化学療法後に憎悪した 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
1クールの日数	14日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	オプジーボ		240	mg/body	div	30分	d1
2							
3							
4							
5							
6							
補足							

催吐リスク	最小度
前投薬	
減量規定	減量基準なし
主な副作用	悪心、食欲不振、下痢、倦怠感、掻痒症、発疹、発熱、関節痛 ※注意を要する副作用 間質性肺疾患、重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、重篤な血液障害、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、副腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、infusion reaction
参考文献	適正使用ガイド（オプジーボ） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	インラインフィルター使用 最終濃度0.35mg/mL以上に調製（総量は60mL以上となるようにする） ※1回240mg投与時の総液量…体重30kg以上：150mL以下 体重30kg未満：100mL以下

投与スケジュール

Day ( 1 )			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL オプジーボ注 1日1回 インラインフィルター使用 体重30kg未満の場合は生食50mLへ希釈	1本 240mg	30分