

癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	DTX+S-1
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発胃癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	DTX	40	mg/m ²	div	1時間	d1
2	エスワン	S-1	下記参照		po		d1夕～d15朝
3							
4							
5							
6							
補足	ドセタキセルの1回最高用量は75mg/m ² まで エスワンの1日量…1.25m ² 未満：80mg 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：100mg 1.5m ² 以上：120mg (最高75mg/回、最低40mg/回)						

催吐リスク	軽度
前投薬	デカドロン注6.6mg
減量規定	ドセタキセル：好中球数2000/mm ³ 未満の場合、投与を延期 減量目安：初回60mg/m ² の場合 1段階減量…50mg/m ² 、2段階減量…休薬 初回70または75mg/m ² の場合 1段階減量…60mg/m ² 、2段階減量…50mg/m ² エスワン：腎障害（Ccr60以上80未満；必要に応じて1段階減量、Ccr30以上60未満；1段階以上の減量、30～40未満は2段階減量が望ましい）
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫、口内炎、味覚異常、色素沈着、流涙
参考文献	適正使用ガイド（ドセタキセル「サワイ」、ティーエスワン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL デカドロン注6.6mg 1日1回	1本 1本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 5%ブドウ糖液250mL ドセタキセル注 1日1回	1本 40mg/m ²	1時間