

癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	SP
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発胃癌
1クールの日数	35日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	エスワン	S-1	下記参照		po		d1夕～d22朝
2	シスプラチン	CDDP	60	mg/m ²	div	2時間	d8
3							
4							
5							
6							
補足	エスワンの1日量…1.25m ² 未満：80mg 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：100mg 1.5m ² 以上：120mg (最高75mg/回、最低40mg/回)						

催吐リスク	高度
前投薬	パロノセトロン注0.75mg、デカドロン注9.9mg、ホスアプレピタント注150mg
減量規定	エスワン、シスプラチン：腎障害（Ccr60以上80未満；必要に応じて1段階減量、Ccr50未満における試験結果はなし）
主な副作用	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、味覚異常、下痢、色素沈着、倦怠感、流涙、末梢神経障害、腎機能障害、聴力障害
参考文献	適正使用ガイド（ティーエスワン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day (8)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 ソリタT1号500mL メトクロプラミド注10mg 1日1回 (持続)	2本 2本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 パロノセトロン注バッグ0.75mg デカドロン注6.6mg デカドロン注1.65mg 1日1回	1本 1本 2本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL ホスアプレピタント注150mg 1日1回	1本 1本	30分
4	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液500mL シスプラチン注 1日1回 投与前30分空ける	1本 60mg/m ²	2時間
5	点滴末梢 メイン1側管1 ソリタT3号500mL フロセミド注20mg 1日1回	1本 1本	2時間