

レジメン名	Durvalumab
対象疾患	切除治癒不能な肝細胞癌
1ケールの日数	28日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与法	投与時間	投与日
1	イミフィンジ		1500(※)	mg/body	div	60分	d1
2							
3							
補足	(※)体重30kg以下の場合、1回の投与量は20mg/kg(体重)とする						

催吐リスク	最小度
前投薬	
減量規定	減量基準なし
主な副作用	悪心、食欲不振、下痢、倦怠感、搔痒症、発疹、発熱、関節痛、咳嗽、呼吸困難 ※注意を要する副作用 間質性肺疾患、大腸炎、重度の下痢、消化管穿孔、内分泌障害(甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体機能障害)、1型糖尿病、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、腎障害、筋炎、横紋筋融解症、心筋炎、重症筋無力症、免疫性血小板減少性紫斑病、脳炎、髄炎、重度の皮膚障害、神経障害、infusion reaction
参考文献	適正使用ガイド（イミフィンジ） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	インラインフィルター使用 最終濃度1～15mg/mLに調製

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液100mL イミフィンジ注 1日1回 インラインフィルター使用	1本 1500mg	60分