

レジメン名	Eriburin+Tmab
対象疾患	HER2陽性 進行再発乳癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ハラヴェン		1.4	mg/m ²	div	2～5分	d1,8
2	ハーセプチン	Tmab	下記参照	mg/kg	div	下記参照	d1
3							
4							
5							
6							
補足	<p>ハーセプチン…初回8mg/kgを90分かけて投与。 2回目以降6mg/kg。忍容性あれば30分まで短縮可。</p>						

催吐リスク	軽度
前投薬	
減量規定	<p>7日間を超えて持続する好中球数減少（500/mm³未満）、発熱又は感染を伴う好中球数減少（1,000/mm³未満）、血小板数減少（25,000/mm³未満）、輸血を要する血小板数減少（50,000/mm³未満）、非血液毒性（Grade3以上）、副作用等により2週目に休薬した場合</p> <p>減量目安：1段階減量…1.1mg/m²、2段階減量…0.7mg/m²</p>
主な副作用	<p>悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、口内炎、倦怠感、心障害、Infusion reaction</p>
参考文献	<p>適正使用ガイド（ハラヴェン、ハーセプチン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）</p>
その他	ハラヴェン：0.01mg/mL未満の濃度に希釈しない

投与スケジュール

Day (1)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL ハラヴェン注 1日1回	20mL 1.4mg/m ²	2~5分 (全開)
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL ハーセプチン注 1日1回	1本 初回8mg/kg 以降6mg/kg	初回90分 以降30分

Day (8)			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL 1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液50mL ハラヴェン注 1日1回	20mL 1.4mg/m ²	2~5分 (全開)