

## 癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	DTX+Tmab
対象疾患	HER2陽性 全乳癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与方法	投与時間	投与日
1	ドセタキセル	DTX	75	mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	d1
2	トラスツズマブBS	Tmab	下記参照	mg/kg	div	下記参照	d1
3							
4							
5							
6							
補足	トラスツズマブBS…初回8mg/kgを90分かけて投与。 2回目以降6mg/kg。忍容性あれば30分まで短縮可。						

催吐リスク	軽度
前投薬	グラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg
減量規定	好中球数2000/mm <sup>3</sup> 未満の場合、投与を延期 減量目安：初回70または75mg/m <sup>2</sup> の場合 1段階減量…60mg/m <sup>2</sup> 、2段階減量…50mg/m <sup>2</sup>
主な副作用	悪心・嘔吐、食欲不振、骨髄抑制、倦怠感、下痢、末梢神経障害、脱毛、関節痛・筋肉痛、浮腫、口内炎、心障害、Infusion reaction
参考文献	適正使用ガイド（ドセタキセル「サワイ」、ハーセプチン） 制吐薬適正使用ガイドライン（日本癌治療学会）
その他	

投与スケジュール

Day ( 1 )			
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間
1	点滴末梢 メイン1 生理食塩液250mL  1日1回 (持続)	1本	持続
2	点滴末梢 メイン1側管1 グラニセトロン注バッグ3mg デカドロン注6.6mg  1日1回	1本 1本	15分
3	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL ドセタキセル注  1日1回	1本 75mg/m <sup>2</sup>	1時間
4	点滴末梢 メイン1側管1 生理食塩液250mL トラスツズマブBS注  1日1回	1本 初回8mg/kg 以降6mg/kg	初回90分 以降30分